
FUNÇÃO MODULAR

DEFINIÇÃO :

MÓDULO DE UM NÚMERO REAL :

Para qualquer número real m , representamos módulo de m por $|m|$, e o definimos do seguinte modo:

$$|m| = \begin{cases} m, & \text{se } m \geq 0 \\ -m, & \text{se } m < 0 \end{cases}$$

EXEMPLOS :

De acordo com o que acabamos de definir, podemos dizer que $|4| = 4$ pois $4 \geq 0$, e $|-3,666| = -(-3,666) = 3,666$ pois $-3,666 < 0$, e ainda que $|0| = 0$ pois $0 \geq 0$.

EXERCÍCIOS :

1) Calcule o valor de cada expressão a seguir :

- a) $|5 \cdot (-7)|$ b) $|-2| - |2|$ c) $1 - |-1|$ d) $2 - |+3-1|$ e) $|-2+5-1| + |-2| + |5| - |-1|$ f) $-|-2+3| - |-3+2|$

Resp.: (a) 35 , b) 0 , c) 0 , d) 0 , e) 8 , f) -2)

2) Obtenha a expressão algébrica mais simples para as expressões dadas, conforme os valores da variável :

- a) $E = |x-3| + |x+1|$, se $x < -3$, b) $Y = 2 \cdot |2 - x| - |x - 1|$, se $x > 2$

Resp.:(a) $E = 2 - 2x$, b) $Y = x - 3$)

DEFINIÇÃO :

FUNÇÃO MODULAR :

A função de \mathbb{R} em \mathbb{R} tal que $f(x) = |x|$ é uma função modular, pois apresenta a variável entre as barras de módulo. Deste modo, as funções $y = |3x - 2| + 4$, $f(x) = x - |4x+2|$ são também exemplos de funções modulares. Por outro lado, a função $f(x) = 4x - |4|$ não é modular, pois a variável não se encontra entre as barras.

TRAÇADO DE GRÁFICOS :

Para representarmos graficamente uma função modular, devemos aplicar a definição de módulo (abrir o módulo) e traçar os gráficos das funções resultantes desta “abertura”. Em seguida, devemos verificar os intervalos de validade de cada uma das sentenças obtidas.


Vejamos os exemplos :

- 1) Representar graficamente a função : $f(x) = |x-4| - 2$


Primeiro passo (abrir o módulo):

$$f(x) = \begin{cases} (x-4) - 2, & \text{se } x-4 \geq 0 \text{ ou seja, se } x \geq 4 \rightarrow y_1 = x - 6 \\ -(x-4) - 2, & \text{se } x-4 < 0 \text{ ou seja, se } x < 4 \rightarrow y_2 = -x + 2 \end{cases}$$

Segundo passo (traçar os gráficos das funções obtidas):



Terceiro passo (reforçar cada função nos seus intervalos de validade):



Como esta função não apresenta impedimentos para valores da variável x , podemos afirmar que seu Domínio é \mathbb{R} . Podemos também perceber que sua Imagem é dada por :

$$\text{Im}(f) = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq -2 \}$$

2) Traçar o gráfico da função $f(x) = |x - 2| - |4 - x|$

Primeiro passo (abrir os módulos) :

$$|x - 2| = \begin{cases} x - 2 & \text{se } x \geq 2 \quad (1) \\ 2 - x & \text{se } x < 2 \quad (2) \end{cases}$$

$$|4 - x| = \begin{cases} 4 - x & \text{se } x \leq 4 \quad (3) \\ x - 4 & \text{se } x > 4 \quad (4) \end{cases}$$


Vemos que o eixo x , que representa o conjunto \mathbb{R} , está dividido pelos números 2 e 4 em 3 intervalos, e, por este motivo, a função $f(x)$ será definida por 3 sentenças :

$$1^{\text{a}} \text{ divisão : } x < 2 : y_1 = (2) - (3) = 2 - x - (4 - x) = -2 \text{ (função constante)}$$


$$2^{\text{a}} \text{ divisão : } 2 \leq x \leq 4 : y_2 = (1) - (3) = x - 2 - (4 - x) = 2x - 6 \text{ (função de } 1^{\text{o}} \text{ grau)}$$

$$3^{\text{a}} \text{ divisão : } x > 4 : y_3 = (1) - (4) = x - 2 - (x - 4) = 2 \text{ (função constante)}$$

Segundo passo (traçar os gráficos das funções obtidas):



Terceiro passo (Fazer os reforços) :




Vemos que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ e que $\text{Im}(f) = [-2, 2]$

3) Representar graficamente a função $f(x) = |x^2 - 4x|$


1º passo : Abrir o módulo :

$$|x^2 - 4x| = \begin{cases} x^2 - 4x, & \text{se } x^2 - 4x \geq 0, \text{ ou seja : se } x \leq 0 \text{ ou } x \geq 4 \rightarrow y_1 = x^2 - 4x \\ -x^2 + 4x, & \text{se } x^2 - 4x < 0, \text{ ou seja : se } 0 < x < 4 \rightarrow y_2 = -x^2 + 4x \end{cases}$$

2º passo : Traçado dos gráficos :



3º passo : Reforçar



Obs : Dom(f) = R e Im(f) = R+







EXERCÍCIOS : Representar graficamente as funções e escrever seu Domínio e sua Imagem :


1) $f(x) = |x-6|$ 2) $f(x) = |x| - 6$ 3) $f(x) = 3 \cdot |2x+8|$ 4) $f(x) = |x^2-9|$

5) $f(x) = |x+2| + |x-5|$ 6) $f(x) = |3x+9| - |4-2x|$ 7) $f(x) = |x^2-4x+3| - 3$

8) $f(x) = \frac{|x-4|}{x-4}$ 9) $f(x) = \frac{x}{|x|}$ 10) $f(x) = 2 \cdot |3x+6| - 3 \cdot |2x-2|$


Resp.:






$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Im}(f) = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq -3 \}$$




$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{ 4 \}$$

$$\text{Im}(f) = \{ -1, +1 \}$$



$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^*$$

$$\text{Im}(f) = \{ -1, +1 \}$$



$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Im}(f) = [-18, +18]$$

DEFINIÇÃO:

EQUAÇÃO MODULAR:

Uma equação é dita modular se apresentar variável entre as barras de módulo.

Exemplos : $2x - |x+4| = 10$, $|x^2 - 4x| = 3$, etc.

Para resolvermos uma equação modular, devemos “abrir” os módulos e resolver a equação polinomial resultante, e , verificar, se for o caso, se os valores obtidos satisfazem a condição de existência dos módulos.

EXEMPLOS :

Resolva as equações em \mathbb{R} :

$$1) |x + 4| = |6 - 2x|$$

Pela definição de módulo, podemos afirmar que a equação apresentada pode ser transformada nas seguintes equações polinomiais :

$$\begin{cases} x + 4 = 6 - 2x \rightarrow 3x = 2 \rightarrow x = \frac{2}{3} \\ x + 4 = -6 + 2x \rightarrow x = 10 \end{cases}$$

Logo, o Conjunto Verdade da equação é $V = \left\{ \frac{2}{3}, 10 \right\}$

$$2) |x+4| = 6 - 2x$$

De acordo com a definição de módulo de um número, temos que $|x + 4| \geq 0$, logo, a expressão $6 - 2x$ também deve ser positiva ou nula. Ou seja : $6 - 2x \geq 0$, e teremos $x \leq 3$.

A equação modular se transforma nas seguintes equações polinomiais :

$$x + 4 = 6 - 2x \rightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$x + 4 = -6 + 2x \rightarrow x = 10 \text{ (que não satisfaz as condições do módulo)}$$

Então o Conjunto Verdade será : $V = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$

$$3) |x|^2 - 2|x| - 15 = 0$$

Para resolvermos esta equação, devemos efetuar uma mudança de variáveis, fazendo com que

$|x| = y$, e passaremos a procurar a solução da equação polinomial de segundo grau na variável y
 $y^2 - 2y - 15 = 0$. As raízes desta nova equação são -3 e 5, então os valores de x serão obtidos do

seguinte modo : $\begin{cases} |x| = -3 \text{ não possui solução, pois devemos ter } y \geq 0. \\ |x| = 5, \text{ então } x = 5 \text{ ou } x = -5 \end{cases}$

Assim, teremos $V = \{-5, 5\}$

4) $|x + 1| + |x - 2| = 5$

Se utilizarmos a definição de módulo teremos as seguintes sentenças :

$$|x + 1| = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1, & \text{se } x < -1 \end{cases} \quad |x - 2| = \begin{cases} x - 2, & \text{se } x \geq 2 \\ -x + 2, & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

Vemos que o conjunto \mathbb{R} fica dividido em 3 intervalos pelos números -1 e 2. Então, teremos :

- a) Se $x < -1$, a equação será: $-x - 1 + (-x + 2) = 5$, cuja solução é $x = -2$.
- b) Se $-1 \leq x < 2$, a equação será: $x + 1 + (-x + 2) = 5$, que não possui solução.
- c) Se $x \geq 2$, a equação será: $x + 1 + (x - 2) = 5$, cuja solução é $x = 3$

Encerrando, poderemos escrever que $V = \{-2, 3\}$.

EXERCÍCIOS : Resolva as equações em \mathbb{R} :

1) $|2x - 14| + 6 = 0$, 2) $|4x - 5| = 8$, 3) $1 - |x - 1| = 0$, 4) $|x^2 - 5| = 4$, 5) $|\frac{x+3}{4}| = 6$,

6) $|3x - x^2| = 2$, 7) $|x|^2 - |3x| + 2 = 0$, 8) $|x|^2 - 3|x| + 2 = 0$, 9) $|17 + 3x| = |1 + 5x|$,

10) $||x - 4| - 5| = 2$. 11) $|x + 3| - |x - 2| = 1$, 12) $x^2 + 3|x| - 10 = 0$.

Resp.: (1) $V = \{\}$, 2) $V = \{-\frac{3}{4}, \frac{13}{4}\}$, 3) $V = \{0, 2\}$, 4) $V = \{-3, -1, 1, 3\}$, 5) $V = \{-27, 21\}$,

6) $V = \{\frac{3 - \sqrt{17}}{2}, 1, 2, \frac{3 + \sqrt{17}}{2}\}$, 7) $V = \{-2, -1, 1, 2\}$, 8) $V = \{-3, 3\}$, 9) $V = \{\frac{9}{4}, 8\}$,

10) $V = \{-3, 1, 7, 11\}$, 11) $V = \{0\}$, 12) $V = \{-2, 2\}$.

DEFINIÇÃO :

INEQUAÇÕES MODULARES :

Analogamente às equações modulares, as inequações assim chamadas são aquelas cuja variável se encontra entre as barras de módulo.

Para a sua resolução, devemos nos lembrar que, se $|m| \geq a$ então $m \leq -a$ ou $m \geq a$, e se $|m| \leq a$ então $-a \leq m \leq a$.

EXEMPLOS :

Resolva em \mathbb{R} as inequações :

1) $|3x + 8| \geq x - 1$

Assim, teremos : $3x + 8 \leq -x + 1$ ou $3x + 8 \geq x - 1$ que são duas inequações polinomiais de 1º grau. A solução da primeira delas é $x \leq -\frac{7}{4}$, e a da segunda é $x \geq -\frac{9}{2}$ e o Conjunto Verdade da Inequação Modular inicial será o intervalo fechado : $V = [-\frac{9}{2}, -\frac{7}{4}]$.

2) $|4 - 3x| < -2$

Esta inequação é impossível pois, pela definição, o módulo de qualquer número deve ser maior ou igual a zero. Logo, $V = \emptyset$.

3) $|5x - 8| < 8$

Dada a inequação modular, podemos afirmar que ela se resume às inequações simultâneas $-8 < 5x - 8 < 8$ cuja solução, conforme capítulo anterior, é $V =]0, \frac{16}{5}[$.

4) $|x^2 - x| \leq 12$

Esta inequação se transforma em $-12 \leq x^2 - x \leq 12$ cuja solução é $V = [-3, 4]$.

EXERCÍCIOS :

Resolva em \mathbb{R} as inequações modulares :

1) $|3 - 4x| < 6$, 2) $4 < |2x - 6| < 8$, 3) $6 \leq |3x + 4| < 4$, 4) $||\frac{2x+4}{x-3}| \geq 2$,

5) $|8 - x^2| < 4$, 6) $|2x^2 - 1| - 1 > 0$, 7) $|\frac{x+2}{x-2}| < 3$, 8) $|\frac{x^2 - 2x}{6 - 3x}| \geq 0$

Resp.: (1) $V =]-\frac{3}{4}, \frac{9}{4}[$, 2) $V =]5, 7[$, 3) $V =]]$, 4) $V = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{1}{2} \text{ e } x \neq 3\}$,

5) $V = \{x < -2\sqrt{3} \text{ ou } x > 2\sqrt{3}\}$,

6) $V = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ ou } x > 4\}$,

7) $V = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 4\}$,

8) $V = \mathbb{R} - \{2\}$.
